

# Вакцинация против клещевого энцефалита

Это самый эффективный способ профилактики.

Нужна лицам, планирующим посещение эндемичных территорий.

Вакцинация проводится по схеме:

V1 — в выбранный день,

V2 — через 1-5 месяцев,

RV — через 12 месяцев,

далее RV — каждые 3-5 лет.

**Для выработки иммунитета требуется не менее двух недель, поэтому завершить курс (две прививки) против клещевого энцефалита необходимо не позднее, чем за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.**



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиенического образования населения» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
г. Москва, 1-й Смоленский пер., д. 9, стр. 1  
e-mail: [cgon@cgon.ru](mailto:cgon@cgon.ru);  
тел.: 8 (499) 241 86 28



# КЛЕЩЕВОЙ ВИРУСНЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ



## Клещевой вирусный энцефалит

Инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему.

Может привести к летальным исходам и стойкой инвалидизации.

## Как заражается человек?

Чаще всего - при присасывании клеща, зараженного вирусом клещевого энцефалита.

## Эндемичные территории

Регионы, где распространены клещи, зараженные вирусом клещевого энцефалита.

Находясь там, следует соблюдать меры предосторожности



## Как предотвратить присасывание клеща

### Правильно одеваться:

- однотонная светлая одежда,
- прилегающие манжеты и воротник,
- брюки заправить в сапоги или носки,
- верхнюю часть одежды заправить в брюки,
- волосы заправить под капюшон, шапку или косынку.

### Проводить само- и взаимоосмотры.

При пребывании в лесу - каждые 15-20 минут.

### Обрабатывать одежду специальными аэрозольными средствами:

- акарицидными,
- репеллентными,
- акарицидно-репеллентными.

### Эти средства никогда нельзя наносить на кожу!



## Что делать, если обнаружили на себе клеща?

- Присосавшегося клеща немедленно удалить.
- Продезинфицировать ранку антисептиком.
- Доставить клеща в лабораторию для выполнения исследования на наличие возбудителей инфекций.



## Как удалить клеща?

Используя специальные приспособления: клещеверт, ручку-лассо.

Подручными средствами: при помощи нитки, пинцета или ногтями.

Любым из способов захватить клеща как можно ближе к коже за хоботок, повернуть вокруг своей оси на 360° и потянуть вверх.

